

Toepassingsgebied	• Multiple 2^{de} (Volwassene >10 % BSA) en/of • 3^{de} graad BW > 5% BSA.
Acties	• Zorg voor vrije luchtweg en controleer op inhalatieletsel • Raadpleeg behandelingskaart voor specifieke behandeling • Wateroplosbaar: spoelen met zuiver water (min 15 min) • Vetoplosbaar: polyethyleenglycol of medidecon, (2min PEG-2min water ged 15') daarna water en zeep. • Brandwonden afdekken met burnshields • Parametercontrole, ook CO en Methgb • 15 l O₂, 100% • IV lijn met 500 cc Hartman (snelle toediening) < 40 % lich opp : 10 ml/kg/u > 40 % lich opp : 20 ml/kg/u • Pijnmedicatie volgens VAS score trauma • Voorkom onderkoeling
Doorverwijzing	Ja, zeker bij - brandwonden aan handpalmen, voetzolen, aangezicht, ogen en perineum. - > 10 % 2^e graads BSA - > 5 % 3^e graads BSA
Opmerking	• Bij inhalatieletsel zie ook SO irriterende gasen • Pek/bitumen: tafelolie of boter (eraxo soft) • Preventie eventuele hypothermie (alu deken)

Beperkte brandwonden

Toepassingsgebied	• Multiple en/of 2^e graad BW. Volwassene < 4 %BSA
Acties	• Spoelen met zuiver water (min 15 min) • Vetoplosbaar: polyethyleenglycol of medidecon, daarna water en zeep. • 1^{ste} graad verzorgen met Flamigel • 2^e graad met Flamigel • 2^e graad huiddefect: flaminol hydro-jelonet • Bij pijn : 1 g Algostase PO, 4/dag
Doorverwijzing	Niet noodzakelijk tenzij er andere indicaties een doorverwijzing noodzaken (zie hier boven)
Opmerking	• Tetanusvaccinatie?