

BLOOTSTELLING HF

CALCIUMGLUCONAAT OPLOSSING 10%

= 940 mg calciumgluconaat + aqua ad injectabilia ad 10 ml.

10 ml => 0.94 gr calcium gluconaat = 10% oplossing calcium gluconate.

HUID (skin):

- o Calciumgluconaat 2.5% gel (zoals klaargemaakt door apotheek) aanbrengen en iedere 15 minuten vernieuwen.
- o Bij letsels >160cm² (dus groot) of na contact met concentraat > 20%: voor injectie kan 5% 0.5 ml / cm² lokaal onder en rond de verbrandde zone (dus 1 ampule aanlengen met 10 cc normal saline) toegediend worden.

ADEMHALINGSWEGEN (airway):

- o Voor aërosol 2.5 % (igv ademhalings blootstelling) moet de ampule oplossing nog 4 maal verdund worden met 30 cc fysiologisch (=> 2.5% oplossing) (1 amp + 30 cc normal saline)
Neem 6 cc af voor aërosol oplossing + 100 % zuurstof via nebuliser.

OGEN (eyes):

- o Voor een 1% oogspoeling oplossing moet de verpakte ampule (van 10 %) nog aangelengd worden met 90 ml fysiologisch water. Spoelen!
(1 amp + 90 cc normal saline)

ORAAAL (oral):

- o Geef F bindende melk (half tot heel glas) of Calcium tabletten (6x500mg)-vermijd braken!

Verdunningstabel

10 ml	1 ampule	1g	1 g / 10 ml	10 %
20 ml	1 ampule + 10 cc fysiologisch	1 g / 20 ml	0,5 g / 10 ml	5 %
40 ml	1 ampule + 30 cc fysiologisch	1 g / 40 ml	0,25 g / 10 ml	2,5 %
100 ml	1 ampule + 90 cc fysiologisch	1 g / 100 ml	0,1 g / 10 ml	1 %