

BLOOTSTELLING HF

SANDOZ CALCIUM OPLOSSING

= Calcii glubionas 1.375 gr (calcii gluconas 0.5 g + calcii lactobionas 0.875g)

+ aqua ad injectabilia ad 10 ml.

10 ml => 0.5 gr calcium gluconaat = 5% oplossing calcium gluconate.

HUID (skin):

- Calciumgluconaat 2.5% gel (zoals klaargemaakt door apotheek) aanbrengen en iedere 15 minuten vernieuwen. Bij letsels >160cm² (dus groot) of na contact met concentraat > 20%: voor injectie kan 5% 0.5 ml / cm² lokaal onder en rond de verbrandde zone (dus gebruik de ampule zoals geleverd) toegediend worden.

ADEMHALINGSWEGEN (airway):

- Voor aërosol 2.5 % (igv ademhalings blootstelling) moet de ampule oplossing nog eenmaal verdund worden met 10 cc fysiologisch (=> 2.5% oplossing) (1 amp + 10 cc normal saline)
Neem 6 cc af voor aërosol oplossing + 100 % zuurstof via nebuliser.

OGEN (eyes):

- Voor een 1% oogspoeling oplossing moet de verpakte ampule (van 5%) nog aangelengd worden met 40 ml fysiologisch water. Spoelen!
(1 amp + 40 cc Normal saline)

ORAAL (oral):

- Geef F bindende melk (half tot heel glas) of Calcium tabletten (6x500mg)-vermijd braken!
-