

Toepassingscriteria Acties	• Inhalatie van irriterend chemisch agens • tekenen van irritatie van de ademhalingswegen • Monitoring , ook CO en Methgb • Bevochtigde O₂, via aërosol of bevochtiger • Bel arts van wacht • Qvar puff 800 mcg, nadien 400 mcg elke 2 uur • Bij ernstige prikkelhoest: paracodine 1co PO • Auscultatie longen Indien Wheezing reutels, stridor: -Aerosol met 2mg adrenaline en 3 ml NaCl 0,9% -250 mg Solu Medrol IV Indien toxisch longoedeem: vochtige reutels, schuimig vocht -start CPAP therapie -Solu Medrol 1000 mg IV
Doorverwijzing Opmerking	Ja ,indien wheezing-reutels en na overleg arts van wacht! Indien respiratoire distress, Mug indicatie Verwijzing AZS (ongevalspapieren niet vergeten) • Raadpleeg steeds de behandelingskaart voor specifieke behandeling en/of bijkomende antidoot behandeling • Aandacht voor bijkomende CO-intox of methgb vorming • Blijf ABC controleren • Let op voor tachycardie, ritmestoornissen • Steeds vicatest (indien mogelijk) • document “vragenlijst contact irriterende gassen” • Bij ontslag: document: “inlichtingen contact irriterende gassen • Bij ontslag: Afspraak bedrijfsarts na 24 uur/1maand/6maand. • Bij ontslag: Qvar puff meegeven (400mcg/2uur gedurende 24 uur.