

	HYPOGLYCEMIE	STAANDE ORDER Nr11
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

1. Toepassingsveld

- Niet gekende of gekende diabetes
- Malaise van ongekende oorsprong + zweten + bleekheid
- Bewustzijnsstoornissen of coma van ongekende oorsprong
- Geagiteerde of verwarde patiënt
- Hemiplegische patiënt
- Convulsies

2. Specifieke behandeling

Indien: glyc. < 60 mg/dl of comateus of nuchter

VOLWASSENE

- Labo
- Perfusie met Glucose 5% 500 ml
- Insiputen van **12 g Glucose IV**
- Monitoring (ECG, BD, SaO₂)
- Indien geen of onvoldoende ontwaken en/of indien glyc. < 60 mg/dl **na 15 minuten**, herneem toediening van 12g Glucose IV.
- Indien geen i.v. toegangsweg: **Glucagon® 1mg IM** (1mg/ml)
- Na ontwaken per os toedienen van traag resorbeerbare suikers (brood) voor preventie van recidief (insuline-dependente patiënten enkel laten eten op maaltijden)

KIND

- Labo
- **IV / IO Glucose 0,2 gr/kg** (zie toedieningsschema)
- gevolgd door perfusie met Glucose 5% (6 ml/kg/u) **door externe MUG**
- **Indien geen toegangsweg IV of IO, geef Glucagon (Glucagen hypokit®):**
 - 1mg IM indien > 6 jaar
 - 0.5mg IM indien < 6 jaar
- Na ontwaken per os toedienen van traag resorbeerbare suikers (bvb. brood) voor preventie van recidief

Indien: glyc. > 60 mg/dl en patient bewust en meewerkend:

- De patiënt per os suiker toedienen met de beschikbare middelen (suikerwater, cola, boterham)
- Bij gebrek, toedienen van **6 gr hypertone Glucose IV**
- Waak over het bewustzijn van de patiënt.

3. Algemene maatregelen

- Indien geen verbetering van het bewustzijn, zoek naar andere oorzaken (trauma, toxisch agens, hypoxie, ...)
- Voor de bewuste patiënt, evalueer de noodzaak van transport naar het ziekenhuis (contact verwijzende arts). Indien de patiënt ter plaatse wordt gelaten, contacteer altijd indien mogelijk de huisarts voor verdere opvolging of de spoedarts.

	HYPOGLYCEMIE	STAANDE ORDER NR11
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

Kinderen
Schema toediening Hypertone Glucose
 Concentratie Glucose 6gr/20ml (0,3gr/ml)

IV Dosis 0,2gr/kg

Lichaamsgewicht Kg	dosis gr	volume ml/IV
3	0,6	2
5	1	3
7	1,4	5
10	2	7
15	3	10
20	4	13
25	5	17
30	6	20
35	7	23
40	8	27

	HYPOGLYCEMIE	STAANDE ORDER Nr11
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

SO 11

Hypoglycemie

