

	QUINCKE OEDEEM EN ANAFYLACTISCHE SHOCK	STAANDE ORDER Nr 19
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

1. Toepassingsveld

Patiënten die zich aanbieden met een van volgende symptomen:

- **Quincke oedeem:** oedeem zonder jeuk in aangezicht en hals, oropharyngeale zone, de genitaliën, snel toenemende dysfagie of dyspnee
- **Anafylactische shock:** warmte, jeuk, urticaria, erytheem, tachycardie, hypotensie, larynxoedeem, bronchospasme, dyspnee; soms shock of hartstilstand als enig beginsymptoom

2. Algemene maatregelen

- Eerste bilan
- Anamnese: allergische omgevingsfactoren, contact met ongewone producten, insectenbeten, inname van voedsel of substanties
- Verwijder het allergeen
- Monitoring (ECG, BD, SaO₂, AF)
- O₂ 15L/min met masker en zak (of OXY-mask)
- Biologie
- Perfusie NaCl 0,9% 500ml snel laten inlopen
- 1 amp **Methylprednisolone (Solumedrol®)** 125 mg /flacon) IV
- 1 amp **Prometazine (Phenergan®)** 50mg/2ml) IM
- 1 amp **Ranitidine (Zantac®)** 50mg/2ml) IV
- 2 amp **Transexaminezuur (Exacyl®)** 500mg/5ml)
- Neem contact met spoedarts en overweeg MUG activatie

3. Specifieke behandeling

3.1. Quincke oedeem

- Plaats de patiënt in zittende houding
- Aërosol **Combivent®** 1 flac. monodosis te hernieuwen
- indien diepe dyspnee, ½ Amp **Adrenaline®** van 1mg, = 0,5mg IM te herhalen elke 5 minuten
- Bij kinderen: Adrenaline 0,01mg/kg IM in de dijspier tot maximum 0,5mg
- Neem contact met de spoedarts bij ernst en overweeg MUG bijstand indien geen snel resultaat of verbetering voor intubatie
- Bij hypotensie geef een vochtbolus met NaCl. 0.9% van 1 liter

3.2. Anafylactische shock

- Plaats de patiënt in ruglig met hoogstand van onderste ledematen
- ½ A **Adrenaline®** van 1mg = 0,5 mg IM, te herhalen elke 5 minuten
- Bij kinderen: Adrenaline 0,01mg/kg IM in de dijspier tot maximum 0,5mg
 - 1 amp Adrenaline 1 mg /ml oplossen met 9ml NaCl 0,9% = 10ml = 0,1mg adrenaline /ml
- Vulling: 20 ml/kg lichaamsgewicht, NaCl 0,9 % 1000ml snel en indien BD syst. <80 mmHg blijft "sweep and treat"
- Vulling bij kind: NaCl 0,9% in bolus, 20 ml/kg snel, met evaluatie tussen elke bolus.
- Maak een vooraankondiging aan het ontvangende ziekenhuis en geef de situatie weer indien "sweep and threat".
- Indien hartstilstand, SO 20 tot 23 toepassen



QUINCKE OEDEEM EN ANAFYLACTISCHE SHOCK


**STAANDE ORDER
NR 19**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

SO 19

Quincke oedeem en anafylactische shock



Adrenaline 1mg/ml		IM
Oplossen in spuit van 9 ml/NaCl 0,9%		
Te geven dosis kinderen: 0,1 mg/10 kg		
concentraie = 0,1mg/ml		
kg	mg te geven	ml te geven
5	0,05	0,5
10	0,1	1
15	0,15	1,5
20	0,2	2
25	0,25	2,5
30	0,3	3
35	0,35	3,5
40	0,4	4
45	0,45	4,5
= 50 <	0,5	5
NOOIT IV GEVEN		