



**ANALGESIE BIJ
TRAUMATISCHE
AANDOENING:
VOLWASSENE EN KIND**

**STAANDE ORDER
Nr2.**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

TER HERINNERING:

**HET REDUCEREN, ALIGNEREN EN FIXEREN GEEFT DE BELANGRIJKSTE PIJNVERMINDERING
STEEDS NAVRAGEN WELKE MEDICATIE REEDS GENOMEN IS.**

▪ <u>Lichte pijn bij de volwassene VAS tussen 2 en 4</u> ▪ Paracetamol 1g IV	▪ <u>Ernstige pijn bij de volwassene VAS >7</u>
▪ <u>Milde pijn bij de volwassene VAS tussen 4 en 7</u> ▪ Paracetamol 1g IV ▪ Diclofenac 75 mg/3ml °IV en/of ▪ Contramal 100 mg IV + Litican 50 mg in 100 cc NaCl. 0.9% over 30 minuten CAVE: Diclofenac niet geïndiceerd bij patiënten ouder dan 75 jaar, voorgeschiedenis van maagulcera of ernstige nierinsufficiëntie.	<u>BIJ DEFORMATIE LIDMAAT, ZEER ERNSTIGE ORTHOPEDISCHE PIJN, BEKLEMD LIDMAAT en BRANDWONDEN</u> ▪ Paracetamol 1 g IV EN ▪ Fentanyl® Oplaaddosis: 1µg/kg traag IV over 2 min. (2ml Fentanyl + 8ml NaCl 0,9%: 1ml = 10µg of 1ml per 10kg) Zo nodig een ½ dosering herhalen na 5 minuten. ▪ Bij nausea of braken Alizapride (Litican®) (50mg/2ml) → 1A IV ▪ Bij angst of agitatie Midazolam (Dormicum®) (amp 15mg/3ml) → Bolus 3mg IV Zo nodig titreren tot max 5mg IV



Altijd monitoring: ECG, SaO2, BD, AF indien Fentanyl en/of Midazolam

Opvolgen sedatiescore:

1. Geen
2. Suf
3. Slaapt makkelijk, doch wakbaar
4. Niet of moeilijk wakbaar

Bij ademhalingsdepressie door Fentanyl: Naloxone (Narcan® 0,4mg/ml) 1 amp. tot 10 cc, titreren per cc.

Bij ademhalingsdepressie door Midazolam: Flumazenil (Anexate® 0,5mg/5ml) 1 amp. tot 10 cc, titreren per cc.



**ANALGESIE BIJ
TRAUMATISCHE
AANDOENING:
VOLWASSENE EN KIND**

**STAANDE ORDER
Nr2.**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

- Milde pijn bij het kind
VAS tussen 4 en 7

- **Paracetamol** IV of IR:
>1 jaar: 15mg/kg
<1 jaar: 7,5mg/kg

En/of

- **Ibuprofen**
suppo: 10mg/kg
(Vanaf leeftijd van 3 maand)
- niet aanwezig op BASF

- Ernstige pijn bij het kind
VAS > 7

**BIJ DEFORMATIE LIDMAAT, ZEER ERNSTIGE
ORTHOPEDISCHE PIJN, BEKLEMD LIDMAAT en
BRANDWONDEN**

- **Paracetamol** IV of IR:
>1 jaar: 15mg/kg
<1 jaar: 7,5mg/kg
EN
- **Fentanyl®** Oplaaddosis: 1µg/kg traag IV
(2ml Fentanyl + 8ml NaCl 0,9%: 1ml = 10µg of
1ml per 10kg) Zo nodig een ½ dosering
herhalen.
- Bij nausea of braken **Alizapride** (Litican®)
(50mg/2ml) → 1mg/kg IV

Indien geen IV of IO toegang

- IR of SL. **Midazolam** (Dormicum®)
(amp=15mg/3ml) → 0,25mg/kg maximaal 10mg

	ANALGESIE BIJ TRAUMATISCHE AANDOENING: VOLWASSENE EN KIND	STAANDE ORDER NR2.
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

Altijd monitoring: ECG, SaO₂, BD, AF indien Fentanyl Opvolgen sedatiescore:

1. Geen
2. Suf
3. Slaapt makkelijk, doch wekbaar
4. Niet of moeilijk wekbaar

Bij ademhalingsdepressie door Fentanyl: Naloxone (Narcan® 0,4mg/ml) 1 amp. tot 10 cc, titreren per cc

Bij ademhalingsdepressie door Midazolam: Flumazenil (Anexate® 0,5mg/5ml) 1 amp. Tot 10 cc, titreren per cc



**ANALGESIE BIJ
TRAUMATISCHE
AANDOENING:
VOLWASSENE EN KIND**

**STAANDE ORDER
Nr2.**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

SO 2

Analgesie bij traumatische aandoening: volwassene en kind

