



**ANALGESIE BIJ NIET
TRAUMATISCHE
AANDOENING:
VOLWASSENE**

**STAANDE ORDER
Nr3**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

MILDE PIJN

ERNSTIGE PIJN

Abdominale en Thoracale pijn (geen angor)

VAS tussen 4 en 7

- 1g **Paracetamol** IV

EN

- 1A° **Alizapride** (Litican®) IV indien misselijkheid en braken

▪

Vermoeden van nierkoliek

VAS tussen 4 en 7

- 1g **Paracetamol** IV
- 1amp **Diclofenac** (Voltaren®) 75mg IV in 100ml NaCl 0,9 % (zo geen voorgeschiedenis van maagulcera of allergie)

EN

- 1amp° **Alizapride** (Litican®) IV indien misselijkheid en braken

VAS > 7

- 1g **Paracetamol** IV
- 1amp **Diclofenac** (Voltaren®) 75mg IV in 100ml NaCl 0,9 % (zo geen voorgeschiedenis van maagulcera of allergie)

EN

- **Fentanyl**® Oplaaddosis: 1µg/kg traag IV over 2 min. (2ml Fentanyl + 8ml NaCl 0,9%: 1ml = 10µg of 1ml per 10kg) Zo nodig een ½ dosering herhalen. om de 5 min. tot VAS <4

EN

- 1A° **Alizapride** (Litican®) IV indien misselijkheid en braken

Acute hoofdpijn:

VAS > 4

- 1g **Paracetamol** IV (15 min)

EN

- 1A° **Alizapride** (Litican®) indien misselijkheid en braken



ANALGESIE BIJ NIET TRAUMATISCHE AANDOENING: VOLWASSENE

STAANDE ORDER
Nr3

Versie : 1

Datum : 22/01/2019

SO 3

Analgesie bij niet traumatische aandoening: volwassene

