

	CONVULSIES BIJ DE VOLWASSENE	STAANDE ORDER Nr 6
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

1. Toepassingsveld

Patiënten met episode van convulsies of slaperigheid, verwardheid of gedragsstoornis na een convulsie-episode (post-kritische toestand)

2. Algemene maatregelen

- Eerste vaststellingen
- Beveilig luchtweg
- Indien patiënt convulsief (trismus), de Mayo cannule niet forceren, stabiele zijligging zolang mogelijk
- Controleer glycemie
- Anamnese: gekende epilepsie, behandeling, ethylisme, diabetes, CO-intoxicatie, CVA, trauma
- Monitoring (ECG, BD, SaO₂)
- Zuurstoftherapie op geleide van de zuurstofsaturatie
- Routine bloed
- Perfusie NaCl 0,9 % 500ml, behalve indien hypoglycemie (SO 11)

3. Specifieke behandeling

- 10mg Midazolam (Dormicum) 15mg/3ml tijdens aanval 10mg IM = 2 ml/ IM, indien (nog) geen IV toegangsweg. Indien persisterend na 3 minuten
- 1mg Midazolam traag IV, telkens te herhalen na 2 minuten tot maximaal 5mg IV. (5ml)
- indien convulsies niet te stoppen, oproep MUG
- Indien de convulsies gestopt, behandel de patiënt zoals een comapatiënt (SO 13)

VOLWASSENEN IM

Midazolam 15mg/3ml

IM bij volwassenen

Concentratie: Puur

IM	Indien geen IV toegang	
	mg te geven	ml te geven
Volw	10 mg	2ml

VOLWASSENEN IV

Midazolam 15mg/3ml

IV bij volwassenen

1 amp aanlengen met 12 ml NaCl

0,9% concentratie: 15 mg/15ml =

1mg/cc IV	Indien Persisterend herhalen traag IV elke 2 min tot max 5mg	
	mg te geven	ml te geven
Volw	1	1

	CONVULSIES BIJ DE VOLWASSENE	STAANDE ORDER Nr 6
	Versie : 1	Datum : 22/01/2019

SO 6

Convulsies bij de volwassene

