



**CPR : VF / VT
VOLWASSENE**


**STAANDE ORDER
Nr 22**

Versie : 1

Datum : 22/01/2019



Gespecialiseerde reanimatie van volwassenen



TIJDENS REANIMATIE

- Zorg voor goed-kwalitatieve borstcompressies
- Minimaliseer onderbrekingen van de borstcompressies
- Geef zuurstof
- Gebruik capnografie
- Geef ononderbroken borstcompressies na endotracheale intubatie
- IV of IO toegang
- Geef adrenaline elke 3-5 minuten
- Geef amiodarone na 3 schokken

BEHANDEL REVERSIEBELE OORZAKEN

- | | |
|--|---|
| Hypoxie | Thrombo-embolie (coronair of pulmonaal) |
| Hypovolemie | Tensiepneumothorax |
| Hypo-/hyperkaliëmie/metabole afwijkingen | Tamponade (harttamponade) |
| Hypo-/hyperthermie | Toxische substanties |

OVERWEEG

- Echografie
- Mechanische borstcompressies om transport of behandeling te vergemakkelijken
- Coronaire angiografie en percutane coronaire interventie
- Extracorporele CPR



In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
www.gezondheid.belgie.be

www.erc.edu | info@erc.edu
Gepubliceerd in oktober 2015 door de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council) vzw,
Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium

Auteursrecht is de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council) vzw - Printed in Belgium - NL, Augustus 2015, Nr. 2015002